


AGIR DEVANT UNE ATTEINTE PRIORITAIRE



Dr Zouari Abdelaziz
CESU 01 - SAMU du Nord-Est

Objectifs



2

- Savoir rechercher une atteinte prioritaire:
 - Hémorragie
 - Obstruction
- Maîtriser les gestes pour sauver la vie
 - Compression locale puis pansement compressif
 - Manœuvres de désobstruction


3

Faisons la découverte

Situation 1

4


- Q1: Décrire l'accident
- Q1: Vous êtes témoin
 - Quels gestes à faire



Situation 1

5


- **R1:**
 - Accident de bricolage à domicile
 - Coupure de la paume de la main
 - Sensation de malaise, s'assoie au sol
 - Flaque de sang de la victime (hémorragie)
 - Présence bidons de produits chimiques
- **Les dangers potentiels:**
 - Présence de sang sur le sol
 - Présence de bidons de produits chimiques
 - Le balai et autres objets qui traînent
 - Le malaise ressentie par la victime



Situation 1

6

- **R1:**
 - Accident de bricolage à domicile
 - Coupure de la paume de la main
 - Sensation de malaise, s'assoie au sol
- **Les risques éventuels:**
 - Transmission de maladies,
 - Projection de produit chimique,
 - Le fait de trébucher sur les objets trainants,
 - L'évanouissement de la victime
 - Soit à la vue du sang
 - Soit par perte de beaucoup de sang



Situation 1


7

R2:

- Rassurer la victime
- Demander lui de ne pas bouger

• Action secouriste:

- Baliser pour interdire l'accès à la zone de danger,
- Eloigner les curieux s'il y en a,
- Appeler à l'aide si vous êtes seul
- Immédiatement se protéger les mains (gants, ...)
- Assurer une compression sur la plaie propre
- Alerter les agents de secours




Situation 2

8

Phase Analyse

1. Le danger ayant causé l'accident est couteau.
2. Les risques
 1. Victime : État de choc
 2. Secouriste: Mies Transmissibles



Phase Action


Supprimer la cause: Eloigner le couteau

Gestes de secourisme: compression locale manuelle
pansement compressif (CHU)


Situation 2

9

Compression manuelle avec une main protégée




Relayer par un pansement compressif



Situation 2

10

- A l'arrivée de l'équipe du SAMU,
- Après l'examen par le médecin ou le paramédical,
- L'infirmier procède à la mise en place d'un pansement sur la plaie avant le transfert aux urgences hospitalières



Les Saignements

11

Action secouriste

12

- Repérer l'origine du saignement par:
 - L'observation de l'origine de l'écoulement de sang
 - La palpation pour rechercher un saignement actif
- Comprimer immédiatement pendant 10 min
- Allonger la victime
- Faire alerter les secours
- Vérifier sans relâcher la compression
- Surveiller l'état de la victime

Action secouriste


13

- Par la suite on peut remplacer la compression manuelle par un pansement compressif : une épaisseur de tissu propre fixé par une bande élastique ou à défaut par un lien large assez long pour le recouvrir. (cousin hémostatique d'urgence)
- En cas d'inefficacité, reprendre la compression manuelle par-dessus le pansement compressif


Type de saignement

14

□ Artériel



□ Veineux



15



Se rappeler


16





- Comprimer
- Allonger & Surveiller
- Alerter

Sans oublier

17



- Compresse 1
- Compresse 2
- Emballage




- Coussin Hémostatique d'Urgence

Epistaxis

18

- Assoir la victime, tête penchée en avant.
- Lui demander de se moucher vigoureusement
- Lui demander de comprimer ses narines (les deux) avec deux doigts pendant 10 m.



Sentarse e inclinarse levemente hacia adelante

Respirar por la boca mientras con los dedos . . .

Taparse las fosas nasales con los dedos . . .

Epistaxis

19

- Dans les saignements de faible abondance, il suffira de pincer le nez entre le pouce et l'index durant environ 10 minutes, la tête penchée en avant pour éviter un écoulement postérieur.




A défaut contacter ou consulter votre médecin

L'obstruction des voies aériennes

20

Se rappeler

21



- Passage dans les voies aériennes
- Immédiatement: manœuvres de désobstruction (Claques dans le dos / Compressions abdominale)

Comment reconnaître

22

- La victime est le plus souvent en train de manger, ou, s'il s'agit d'un enfant, en train de jouer avec un objet porté à la bouche.

- Brutalement, la victime:
 - porte la main à sa gorge,
 - ne peut plus parler,
 - garde la bouche ouverte,
 - fait des efforts pour respirer sans que l'air n'entre ni ne sorte,
 - ne peut plus tousser.

Agir pour la désobstruction

23

- Donner de 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos entre les deux omoplates
- Le thorax soutenu par l'autre main



Agir pour la désobstruction

24



En cas d'inefficacité

Faites 1 à 5 compressions abdominales au niveau du creux de l'estomac avec le poing

Se rappeler

25


5 Claques dans le dos



5 Compressions Abdominales

The slide features two circular photographs. The left one shows a person in a dark shirt slapping the back of a person in a white shirt. The right one shows a person in a white shirt performing abdominal compressions on a person in a white shirt. Green arrows connect the two photos in a clockwise cycle.

26



The slide contains two illustrations. The left one shows a person in a white shirt slapping the back of a person in a blue shirt. The right one shows a person in a white shirt performing abdominal compressions on a person in a blue shirt.

Si Perte de Connaissance

27



The slide contains three illustrations. The left one shows a person in a white shirt kneeling and checking the pulse of a person in a blue shirt lying on the floor. The middle one shows a person in a white shirt performing the Heimlich maneuver on a person in a blue shirt who is lying on their back. The right one shows a person in a white shirt performing abdominal compressions on a person in a blue shirt who is lying on their back.

Désobstruction chez le nourrisson

28

Maintenir le nourrisson sur votre avant bras et donner de 1 à 5 tapes dans le dos avec le talon de la main




Désobstruction chez le nourrisson


29


En cas d'inefficacité

Faites de 1 à 5 compressions thoraciques au milieu de la poitrine avec 2 doigts



30






Cas particuliers

32

- La compression ne se fait plus au niveau de l'abdomen, mais au **niveau du thorax**
- La compression ne se fait plus vers le haut.



Cas particuliers

33



Sans oublier l'avis médical

34

- Cause de l'accident
- Gestes effectués
- État des victimes
- Attendre les instructions

190

198

XXX



Résumons

35

- Une suite logique de gestes