



Plaie 1

4




Plaie simple

- Décrire la plaie
- Elle peut être causée par
- Agir devant cette plaie

Plaie 2

5



Plaie grave

- Décrire la plaie
- Elle peut être causée par
- Agir devant cette plaie

Situation 1

6



- R1:**
 - Accident suite à une rixe
 - Plaie du tendon d'Achille
 - Pas de grand saignement
 - Présence de l'arme ayant causé l'accident

• Les dangers potentiels:

- Présence de l'arme de la plaie
- Pas de grand saignement
- La victime semble en bonne santé

Situation 1

7

- ❑ **R1:**
 - ❑ Accident suite à une rixe
 - ❑ Plaie du tendon d'Achille
 - ❑ Pas de grand saignement
 - ❑ Présence de l'arme ayant causé l'accident


- **Les risques éventuels:**
 - Transmission de maladie,
 - Infection de la plaie,
 - Aggravation de l'état de la victime



Situation 1

8

- ❑ **R2:**
 - **Action secouriste:**
 - Baliser la zone de danger,
 - Eloigner les curieux,
 - Appeler à l'aide si vous êtes seul
 - Evaluer l'état de la victime,
 - Enfiler des gants après le lavage des mains
 - Désinfecter la plaie puis l'emballer
 - Alerter les agents de secours



Plaie 3

9

- ❑ Décrire la plaie
- ❑ Elle peut être causée par
- ❑ Agir devant cette plaie



Plaie 4

10

- Décrire la plaie
- Elle peut être causée par
- Agir devant cette plaie



Plaie grave

Plaie 5

11

- Décrire la plaie
- Elle peut être causée par
- Agir devant cette plaie



Plaie grave

Plaie 6

12

- Décrire la plaie
- Elle peut être causée par
- Agir devant cette plaie



Plaie simple

Plaie: définition

13

- La plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec atteinte possible des tissus sous la peau.
- Les plaies sont généralement secondaires à un traumatisme.

- Elles sont provoquées par :
 - une coupure,
 - une éraflure,
 - une piqûre.

Identification de la gravité

14

- **de sa localisation**
 - (cou, œil, face, thorax ou abdomen)
- **de son aspect**
 - (saigne beaucoup, déchiquetée, multiple et/ou étendue)
- **de son mécanisme**
 - (par projectile, outil, morsure ou par un objet tranchant...)

Alors ?

15



Gravité d'une plaie

16

On parle de plaie simple:

lorsque la coupure ou l'éraflure est

- de taille réduite (moins de la moitié de la paume de la victime),
- sans souillure (vomissement, matière fécale, eau sale, ...)
- ni corps étranger (verres, graviers,)
- et ne se trouvant pas à proximité d'un orifice naturel ou d'une articulation.

On parle de plaie grave:

lorsque la coupure ou l'éraflure est à l'opposé de ce qui vient d'être annoncé

Types de plaies

17

En fonction du degré d'atteinte.

- **Plaie superficielle** : il s'agit d'une simple érosion où les berges sont légèrement écartées nécessitant un rapprochement par pansement ou une suture. Il n'y a pas d'infection et la guérison survient en une à deux semaines.
- **Plaie avec perte de substance modérée et bords éloignés** : les bords de la plaie sont, dans ce type de plaie, trop éloignés pour être rapprochés ; il faudra, donc, attendre la formation d'un tissu de granulation qui se constitue lentement (cicatrisation dirigée) et procéder éventuellement à une suture secondaire.
- **Plaie plus grave** : elle est caractérisée par une importante perte de substance, une lésion étendue parfois infectée et un exsudat abondant. Dans ce type de plaie, il faut en premier lieu traiter l'infection.



18 **Agir devant une plaie**

Agir devant une plaie simple

19









Agir devant une plaie grave

20

- Identifier la gravité de la plaie
- Si la plaie saigne abondamment
 - adopter l'action devant un saignement
 - Installer la victime en position d'attente
- Demandez un avis médical (SAMU – Propre Moyen).
- Si Propre Moyen:
 - Emballer la plaie par compresses stériles
- Si Attente du SAMU
 - Protégez la victime du froid ou de la chaleur et des intempéries.
 - Parlez régulièrement lui et expliquer- lui ce qui se passe pour la réconforter.
 - Signalez l'aggravation en rappelant les secours.

Exemples de plaies

21


- Ecorchure
 

- Punctiforme
 

- Lacération
 

- Coupure
 




22 **Cas particuliers**

Plaie abdominale

23




- Si le contenu de l'intestin est sortie (appelée éviscération), le blessé sera allongé, les jambes fléchies pour qu'il ne pousse pas trop.
- Un pansement stérile si possible humidifié mais avec de l'eau stérile uniquement, recouvrira la plaie.
- Il ne faut pas tenter de réintégrer les organes.

Action secouriste

24

- Aider la victime à s'allonger, **hanches et genoux fléchis.**



Hémorragie Interne

25

- Des éraflures signent le traumatisme.
- L'abdomen peut être douloureux, dur.
- Il faut rechercher le moindre signe de choc hémorragique :
 - pâleur surtout des conjonctives
 - Soif d'importance variable
 - extrémités froides, marbrures
 - pouls rapide et filant
 - Tension artérielle variable:

Arme blanche: Hémorragie Interne

26


- Pour une plaie par arme blanche, il est important de ramener l'objet ou à défaut de connaître la longueur de l'abdomen ou le thorax . (Le médecin doit pouvoir évaluer si l'arme est rentrée dans l'abdomen ou reste superficielle)

- Ne pas retirer l'arme
- La laisser en place
- Entourer par un linge propre
- Appelez les secours (SAMU)



Arme à feu: Hémorragie Interne

27



- Pour une plaie par arme à feu, il faut
 - retrouver l'entrée et la sortie,
 - évaluer le trajet de la balle.




Cas de section de doigt

28

➤ Ne jamais mettre en contact direct avec la glace

➤ Cela risquerait d'endommager radicalement la partie du corps sectionnée.....



Le Sauveteur récupère le doigt Et le préserve en l'isolant de la glace...

Section de membre agir vite

29



- Un membre sectionné, ne saigne pas toujours abondamment,
- Seulement cela ne dure pas mais cela vous laissera le temps d'effectuer un appui manuel direct, ou de placer un garrot!
